



精华制药

江苏医保  
江苏基药

宁星<sup>®</sup>

# 晕可平颗粒

——百年传世秘方  
眩晕症首选



精华制药

# 目录

1. 产品介绍
2. 药理作用
3. 临床应用
4. 产品优势





精华制药

# 1. 产品介绍




# 产品概况



**晕可平颗粒**是根据全  
国名老中医、北京中日友好  
医院博士生导师**史载祥**根据  
百年传世秘方并结合自身临  
床经验研制而成。应用于临  
床**40**余年。

**【功能主治】**：**潜阳镇肝**。用于内耳眩晕症，  
头晕，目眩症。

# 组分介绍



(赭石、夏枯草、法半夏、车前草，比例：2.5：1：1：1)

# 组分介绍

## 赭石



**【性味】**： 苦甘，平。

**【功效】**： 平肝潜阳； 重镇降逆； 凉血止血。

**【主要成分】**： 三氧化二铁

**【药理作用】**： 兴奋肠管  
促进红细胞及血红蛋白新生  
对神经系统有镇静作用



# 组分介绍

## 夏枯草



**【药性】** 辛、苦，寒。归肝、胆经。

**【功效】** 清热泻火，明目，散结消肿。

**【主要成分】** ：本品含三萜皂苷（夏枯草皂苷）、黄酮类等。

**【药理作用】** ： 降低血压  
                  抗炎  
                  抑菌



# 组分介绍

## 车前草



【药性】味甘；性寒。

【功效】利尿、清热、明目、祛痰。

【主要成分】： 黄酮类、黄酮醇及其苷类、苯乙醇苷类。

【药理作用】： 抗炎  
利尿，增加尿素、尿酸及氯化钠的排出  
镇咳、平喘、祛痰  
抗病原微生物



# 组分介绍

## 法半夏



**【药性】** 辛、温。

**【功效】** 燥湿化痰，降逆止呕，  
消肿止痛。

**【主要成分】** ：多种氨基酸；微量挥发油；生物碱（左旋  
盐酸麻黄碱）

**【药理作用】** ：镇咳，镇吐  
抗溃疡作用、调节肠胃功能  
利胆  
抗癌



精华制药

# 产品功效

头痛眩晕

耳鸣耳聋

失眠多梦

肝阳上亢

平肝潜阳

潜阳，治疗学术语。系一种治法。用赭石等质重镇坠的药物以收敛虚阳。





精华制药

## 2. 药理作用





精华制药

# 药理作用

## 中国中医研究院中药研究所实验证实：

1. 晕可平（19g/kg）口饲小鼠，能明显延长戊巴比妥钠诱导的睡眠时间，表明晕可平有一定的**镇定**作用。

2. 晕可平对醋酸引起的小鼠腹膜引起的疼痛有显著的抑制作用，表明小鼠有**镇痛**的作用。





精华制药

# 药理作用

3. 让小鼠正加速旋转，重力由头向足，循环系统产生静力学作用，血液向下流注，脑内血液不足，血压下降，心脏血液量减少，意识丧失，休克。实验证明晕可平增强小鼠存活的时间，提示晕可平**增强脑组织缺血缺氧的耐受力**。

4. 晕可平颗粒对肝旺痰阻型自发性高血压大鼠有**降压、降脂及降低血管紧张素 II 浓度的作用**。



# 毒理研究

南通医学院药理学教研室的急毒性试验结果表明：**小鼠灌服晕可平颗粒，最大耐受量大于人临床推荐用量的100倍（50g/Kg）。**





精华制药

# 3. 临床应用





精华制药

## 3 . 临床应用

# 眩晕症

美尼尔氏综合  
合症

痰湿型高血压

颈椎病以及中  
耳疾病及中耳  
手术后遗症引  
起的







# 晕可平颗粒对几种眩晕症作用的临床研究

上海第二医科大学利用晕可平颗粒对眩晕症（其中主要是美尼尔氏病、颈椎病、中耳疾病及中耳手术后遗症等）进行治疗。32例患者，其中美尼尔氏病患者18人，颈椎病患者10人，中耳疾病及中耳手术后遗症4人。

治疗方法：每日三次，每次一包，连续七天。





# 晕可平颗粒对几种眩晕症作用的临床研究

治疗结果如下：

18例美尼尔氏患者服晕可平颗粒七天后：

	例数	痊愈	显效	有效	无效
重度眩晕	10	4	3	2	1
中度眩晕	6	2	2	1	1
轻度眩晕	2	1	1	0	0

**总有效率：88.9%**





# 晕可平颗粒对几种眩晕症作用的临床研究

10例各类颈椎病患者服晕可平颗粒七天后：

	例数	痊愈	显效	有效	无效
重度眩晕	0	0	0	0	0
中度眩晕	7	1	4	2	
轻度眩晕	3	1	1	0	1

**总有效率：90%**





# 晕可平颗粒对几种眩晕症作用的临床研究

4例中耳疾病及中耳手术后眩晕者服晕可平颗粒七天后：

	例数	痊愈	显效	有效	无效
重度眩晕	0	0	0	0	0
中度眩晕	1	0	0	1	0
轻度眩晕	3	0	1	1	1

**总有效率：75%**





# 晕可平颗粒对于颈性眩晕的治疗

山东省聊城市人民医院门诊及住院颈性眩晕（CV）患者60例，随机分为两组。

**治疗组：**30例，**口服晕可平颗粒**(精华制药集团股份有限公司生产)，每次10g，每日3次。


**对照组：**30例，给予盐酸氟桂利嗪(西安杨森制药有限公司生产)，每日10mg，睡前口服。

**两组均以2周为1疗程，连续观察2个疗程。**





# 晕可平颗粒对于颈性眩晕的治疗




# 晕可平颗粒对于颈性眩晕的治疗

## 1. 治疗组与对照组临床疗效比较

表 1 两组临床疗效比较 n(%)


组别	n	痊愈	显效	有效	无效	总有效
治疗组	30	14(46.67)	8(26.67)	7(23.33)	1(3.33)	29(96.67) <sup>△</sup>
对照组	30	8(26.67)	6(20.00)	10(33.33)	6(20.00)	24(80.00)

与对照组比较,  $\Delta P < 0.05$



# 晕可平颗粒对于颈性眩晕的治疗

2. 治疗组与对照组双侧椎动脉(VA)和基底动脉(BA)的收缩峰最大流速(Vs) 改善情况比较:



注：椎动脉和基底动脉的收缩峰最大流速大，脑部血流量大，眩晕、耳鸣等减轻





# 晕可平颗粒对于肝旺痰阻型高血压引起的眩晕的治疗

江苏省南通市中医院心内科门诊或住院, 主诉有头晕和(或)头痛、符合高血压病和中医 肝旺痰阻证诊断的患者50例, 随机分为对照组、治疗组各25例。**治疗组**在对照组(西药常规治疗)的基础上, **加服晕可平颗粒, 4周为一疗程。**

**结果显示**(1)临床证候:**治疗组中医证候临床总有效率为 88.00%,**

对照组中医证候临床总有效率为 56.00% 。

(2)血脂: **治疗组**治疗后**总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白**

**(LDL-C)**较治疗前**明显下降**( $P > 0.05$ )。对照

组血脂四项则均无显著变化。

**结论:** 晕可平颗粒能有效改善高血压患者头晕和(或)头痛等临床症状, 中医证候积分的改善明显优于西药对照组, **同时具有一定的调节血脂作用。**



## 典型案例

潘××，女，27岁，反复眩晕恶心已有数年，左耳鸣，但听力和前庭功能检查均在正常范围。X片示颈椎退变，脑动脉供血不足，常因此不能坚持上班，服用晕可平颗粒后，眩晕明显好转，无旋转感觉，恶心消失，耳鸣减轻。

杨××，女，32岁，因颈部疼痛，阵发性眩晕发作3年，平时常头晕。X片示颈椎增生性改变，服用晕可平颗粒二盒后，眩晕不发作，平时无头晕感觉。



精华制药

# 适用科室

神经内科

心内科

脑科

老年科

耳鼻喉科

## xx第一人民医院

科室分类	主任名称	晕可平颗粒运用的疾病
内科一，消化内科	李主任	脑供血不足引发的眩晕、美尼尔氏病
内科四，神经内科	顾主任	周围性眩晕与中枢性眩晕所涵括的疾病均能使用
内科六，呼吸内科	毛主任	脑血管病、美尼尔氏病
内科七，心血管科	李主任	脑供血不足、高血压、颈椎病、美尼尔氏病、内耳炎

## xx中医院

科室分类	主任名称	晕可平颗粒运用的疾病
中医科	桑主任	凡是过来描述有眩晕症状的病人均可使用



精华制药

## 4. 产品优势




# 晕可平颗粒的优势

**1. 晕可平颗粒是在晕可平糖浆基础上发展起来的新剂型，有着比较明显的优点，发展前景非常良好。**

- (1) 中药颗粒剂是在传统的汤剂和糖浆剂的基础上发展的剂型，既保持了汤剂作用迅速的优点，又克服了临时煎煮的麻烦和易霉坏变质的缺点；
- (2) 颗粒剂可溶解或混悬于水中，有利于药物在体内吸收，保持了液体制剂起效快的特点，但较液体制剂性质稳定，便于服用、携带、贮存；
- (3) 适当加入芳香剂、矫味剂、着色剂等，可制成色、香、味俱全的药物制剂，患者乐于服用。

**2. 经多年临床疗效观察，晕可平颗粒疗效确切，安全，副作用几乎没有。晕可平颗粒与其他药物联合使用几乎无相互作用，“三高”病人（除糖尿病患者）均可使用，适用范围广，特别对于痰湿型高血压眩晕，治疗效果更佳。**

**3. 价格便宜，服用方便，病人依从性较高；**





精华制药

# 竞品比较

品名	规格	组成成分	功能主治	服用方法	不良反应及副作用
晕可平颗粒	10g*6袋	赭石、夏枯草、法半夏、车前草。	潜阳镇肝。用于内耳眩晕症，头晕，目眩症。	开水冲服，一次10克，一日3次。	尚不明确
养血清脑颗粒	4g*15袋	当归、川芎、白芍、熟地黄、钩藤、鸡血藤、夏枯草、决明子、珍珠母、延胡索、细辛。	养血平肝，活血通络。用于血虚肝亢所致的头痛，眩晕眼花，心烦易怒，失眠多梦。	口服，一次1袋，一日3次。	偶见恶心、呕吐，罕见皮疹，停药后即可消失。
全天麻胶囊	每粒装0.5g	全天麻	平肝、息风、止痉 主治肝风上扰所致的眩晕、头痛、肢体麻木、癫痫抽搐	口服。一次2~6粒，每日3次	头晕、恶心、胸闷、皮肤丘疹伴瘙痒等，个别会出现面部或全身浮肿，甚至脱发现象。
盐酸氟桂利嗪胶囊	5mg/粒(以氟桂利嗪计)。	盐酸氟桂利嗪	适应症为典型(有先兆)或非典型(无先兆)偏头痛的预防性治疗。由前庭功能紊乱引起的眩晕的对症治疗。	对于65岁以下患者开始治疗时可给予每晚2粒，65岁以上患者每晚1粒但应在控制症状后及时停药，初次疗程通常少于2个月	①嗜睡和疲惫感为最常见。 ②长期服用者可以出现抑郁症，女性患者较常见。 ③锥体系症状，表现为不自主运动、下颌运动障碍、强直等。



精华制药

# 谢谢！

